Prénom : Nom : Date :



QUESTIONNAIRE POUR DÉPISTER LA SURDITÉ APRÈS 60 ANS

Filière Gérontologique du Roannais

Ce questionnaire est un outil validé et facilement accessible pour être diffusé au plus grand nombre. La grille de résultats permet une lecture rapide et facilite l'orientation du répondant.

1 Vous sentez-vous mal à l'aise à cause d'un problème d'audition lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non

2 Vous sentez-vous frustré(e) par un problème d'audition lorsque vous parlez aux membres de votre famille ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non

3 Avez-vous des difficultés pour entendre quand quelqu'un parle à voix basse ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non

4 Vous sentez-vous handicapé(e) par un problème d'audition ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non

5 Est-ce qu'un problème d'audition vous met en difficulté lorsque vous rendez visite à des amis, parents ou voisins ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non

6 Assistez-vous moins souvent que vous le voudriez à certains évènements (spectacles, concerts, cérémonies religieuses) à cause d'un problème d'audition ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non

7 Est-ce qu'un problème d'audition est à l'origine de disputes avec les membres de votre famille ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non

8 Est-ce qu'un problème d'audition vous met en difficulté pour écouter la TV ou la radio ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non


9 Avez-vous l'impression qu'une quelconque difficulté d'audition limite ou gêne votre vie personnelle ou sociale ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non

10 Est-ce qu'un problème d'audition vous met en difficulté lorsque vous êtes au restaurant avec des parents ou des amis ?

4) Oui
2) Parfois
0) Non

Source : Travaux de l'équipe ORL du CHU de Bordeaux Pellegrin - Dr Damien BONNARD



Un questionnaire pour dépister la surdité après 60 ans

Un nouvel outil est désormais disponible face à l'enjeu de santé publique du dépistage de la presbyacousie. L'équipe du service ORL du CHU de Bordeaux a validé et adapté le questionnaire anglo-saxon HHIE-S.

Audiologie Demain / Dec 12, 2020

Calculez le nombre de points total obtenu

Vous avez entre 0 et 8 points : la probabilité d'avoir une déficience auditive est de 11 %
Probabilité faible

Vous avez entre 10 et 16 points : la probabilité d'avoir une déficience auditive est de 74,5 %
Probabilité élevée

Vous avez entre 18 et 40 points : la probabilité d'avoir une déficience auditive est de 94 %
Probabilité très élevée

L'enjeu du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge de la surdité de l'adulte après 60 ans est plus que jamais d'actualité. Le constat est maintenant bien établi que la surdité de l'adulte, et notamment des plus âgés, est sous diagnostiquée. Beaucoup de patients qui pourraient bénéficier d'un appareillage auditif ne rentrent en fait jamais dans le parcours de soin adapté.

La vision et l'audition ont un effet majeur sur la relation de la personne à son environnement. Leur altération favorise l'isolement et l'aggravation des troubles cognitifs.

Après 60 ans, il est conseillé de réaliser un bilan auditif tous les deux ans, en l'absence de signes d'alerte.

Au moindre doute, je consulte mon médecin généraliste qui m'orientera vers un médecin ORL.

La presbyacousie est une diminution de l'audition liée à l'âge. Elle s'aggrave progressivement. Grâce à un diagnostic précoce, la personne peut bénéficier d'une aide auditive adaptée et, ainsi, se sentir moins gênée dans la vie quotidienne par sa surdité.